

УДК 633.111“324”-021. 5: 582. 093

БУРДЕНЮК-ТАРАСЕВИЧ Л.А., д-р с.-г. наук

Білоцерківське відділення Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

ЛОЗІНСЬКИЙ М.В., канд. с.-г. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

ДУБОВА О.А., канд. с.-г. наук

Білоцерківське відділення Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

КУЩИСТІСТЬ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Висвітлено особливості формування загальної та продуктивної кущистості лініями пшениці м'якої озимої різного еколо-географічного походження. Досліджено вплив загальної і продуктивної кущистості на формування маси зерна з однієї рослини. Встановлено кореляційні зв'язки загальної і продуктивної кущистості з надземною масою рослини, кількістю зерен і масою зерна з рослини.

Ключові слова: пшениця м'яка озима, загальна кущистість, продуктивна кущистість, лінії, екотип, кількість зерен, маса зерна, коефіцієнти кореляції.

Постановка проблеми. Важливим завданням в селекції пшениці м'якої озимої є створення сортів з високою продуктивністю. В останні роки у зв'язку з глобальними змінами клімату особлива увага приділяється селекції на підвищення адаптивного потенціалу сортів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей реалізації потенціалу урожайності і виявлення механізмів формування компонентів продуктивності з найбільш важливих господарсько цінних комплексів культурних рослин в мінливих умовах навколошнього середовища має важливе значення для виявлення норми реакції на середовище і добір найбільш стійких продуктивних ліній, сортів і включення їх в селекційні програми [1].

Характерною біологічною особливістю хлібних злаків є властивість кущитися. Розрізняють загальну і продуктивну кущистість. Під загальною кущистістю розуміють кількість стебел, яка припадає на одну рослину, під продуктивною – ту кількість стебел, яка забезпечує врожай зерна [2].

Відносно кущистості пшениці в літературі існує дві протилежні думки. Одні дослідники [3] в більшій кущистості вбачають позитивну сторону; інші – негативну, тобто зворотну залежність між кущінням і урожайністю зерна з одиниці площі [4, 5].

Академік Д. М. Прянишников, розглядаючи питання про інтенсивність кущення хлібних злаків, зазначав: “Часто вважають, що чим краще розвинута окрема рослина й більше вона кущиться, тим більшою буде урожайність з одиниці площі. При цьому не враховують, що сильне кущення буває лише на зріджених посівах”. До речі, слід додати, що з районованих сортів пшениці озимої в 70-их роках минулого століття до групи найбільш урожайних належала Безоста 1, яка відзначалася незначною кущистістю. Очевидно, найвищу урожайність пшениці озимої можна одержати за оптимальної густоти посіву з урахуванням біологічних особливостей окремих сортів [2].

Метою досліджень була порівняльна оцінка ліній пшениці м'якої озимої різного еколо-географічного походження за загальною і продуктивною кущистістю та визначення норми їх реакції на зміну умов вирощування, а також встановлення кореляційних зв'язків між загальною і продуктивною кущистістю та надземною масою рослини, кількістю зерен і масою зерна з рослини.

Матеріал та методика проведення досліджень. Дослідження проводили в умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції (БЦДСС) Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ) у 2011-2012 рр. Матеріалом досліджень були 11 ліній пшениці м'якої озимої станційного сортовипробування різного еколо-географічного походження. Шляхом схрещування степового екотипу з лісостеповим одержано лінії: Донецька 48 x Веселка (7 СС), Донецька 48 x Білоцерківська інтенсивна (8 СС), Повага x Перлина Лісостепу (42 СС), Луганчанка x Білоцерківська 71/03 (29 СС), Роставиця x Дріада 1 (26 СС), Білоцерківська 47 (скверхед) x Одеська 162 (24 СС); лісостепового екотипу з лісостеповим: Елегія x Перлина Лісостепу (12 СС), Київська 8 x Роставиця (44 СС), Веселка x Миронівська 65 (54 СС);

степового екотипу з сортом Century (США) Донецька безоста х Century (22 СС); лісостепового екотипу з сортом Century (США) Напівкарлик 3 х Century (17 СС). Лінії різного походження порівнювали між собою та з національними стандартами Білоцерківська напівкарликова (БЦДСС), Перлина Лісостепу (БЦДСС), і Подолянка (Миронівський інститут пшениці і Інститут фізіології рослин і генетики). Досліди закладали відповідно до загальноприйнятих методик [6, 7]. Попередник – горох. Агротехніка була загальноприйнятою для зони Лісостепу.

Визначали середню арифметичну \bar{X} , розмах мінливості (min–max) та коефіцієнт варіювання $V, \%$ [6, 8]. Ступінь кореляційних зв'язків між загальною та продуктивною кущистістю і елементами продуктивності визначали за результатами структурного аналізу 25 рослин, відбраних в триразовій повторності на початку повної стигlosti. При встановленні сили зв'язку між ознаками використовували запропоновану Ю.Л. Гужовим із співробітниками [9] шкалу $r < 0,3$ – зв'язок між ознаками слабкий, $0,3 < r < 0,5$ – помірний, $0,5 < r < 0,7$ – значний, $0,7 < r < 0,9$ – сильний, $r > 0,9$ – дуже сильний, близький до функціонального.

Результати експериментальних даних обробляли за допомогою комп’ютерних програм Excel і Statistica 6.0.

Результати досліджень та їх обговорення. Роки проведення досліджень різнилися за погодними умовами. Так, у вересні-листопаді (I-II етапи органогенезу) 2010 р. випало 121,8 мм опадів, що близько до середньобагаторічних показників (123,8 мм). Навпаки, осінній період 2011 р. характеризувався значним дефіцитом опадів (випало на 40,9 мм менше середньобагаторічних показників). У березні і квітні 2011 р. (III-й етап органогенезу) опадів випало менше норми на 53 мм, що не сприяло збільшенню загальної і продуктивної кущистості. Весняний період (березень-квітень) 2012 р. навпаки, характеризувався більшою кількістю опадів – 91,4 мм, за середньобагаторічних показників 77,0 мм – що певною мірою компенсувало несприятливі погодні умови осіннього періоду 2011 р. Аналіз

погодних умов свідчить про їх значний вплив на формування загальної і продуктивної кущистості.

Загальна кущистість у ліній в роки дослідження значно варіювала залежно від походження. Для ліній 7 СС, 42 СС, 29 СС, 54 СС і сортів-стандартів Білоцерківська напівкарликова (ранньостиглий сорт), Перлина лісостепу (середньостиглий сорт) більш сприятливими для формування загальної кущистості виявилися умови 2010-2011 рр. (табл. 1).

Таблиця 1 – Загальна кущистість стебел у досліджуваних ліній станційного сортовипробування

Походження ліній і сорти-стандари	Селекційний номер	Загальна кущистість стебел, шт.		Статистичні параметри (середнє за 2011-2012 рр.)		
		2011 р.	2012 р.	Lim, шт.	min	max
Степовий екотип х лісостеповий екотип						
Донецька 48 x Веселка	7 СС	4,9	4,6	3	7	25,5
Донецька 48 x Білоцерківська інтенсивна	8 СС	4,6	4,6	3	6	21,7
Повага x Перлина лісостепу	42 СС	4,7	4,5	2	8	33,0
Луганчанка x Білоцерківська 71/03	29 СС	4,9	4,7	2	9	32,9
Роставиця x Дріада 1	26 СС	4,0	4,2	1	8	46,1
Білоцерківська 47 (скверхед) x Одеська162	24 СС	4,3	4,3	2	7	31,2
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип						
Елегія x Перлина лісостепу	12 СС	4,8	5,4	3	8	24,8
Київська 8 x Роставиця	44 СС	5,0	5,1	2	7	29,2
Веселка x Миронівська 65	54 СС	4,5	4,3	2	8	26,9
Степовий екотип х США						
Донецька безоста x Century	22 СС	4,7	5,3	1	8	33,5
Лісостеповий екотип х США						
Напівкарлик 3 x Century	17 СС	4,4	4,9	2	7	26,9
Білоцерківська напівкарликова (St)		4,9	4,3	2	7	30,7
Перлина лісостепу (St)		4,9	4,3	2	7	33,7
Подолянка (St)		4,1	4,5	2	6	32,1
HIP ₀₅		0,3	0,2			

Встановлено, що найбільшу загальну кущистість (5,1 шт. стебел), в середньому за два роки, мали лінії 12 СС і 44 СС і вони достовірно перевищили за цим показником інші лінії і сорти-стандарти. В сортів-

стандартів Білоцерківської напівкарликової, Перліни лісостепу і Подолянки загальна кущистість становила 4,3; 4,6 і 4,6 шт. відповідно.

Коефіцієнт варіації загальної кущистості досліджуваних ліній знаходився в межах 21,7-46,1 %, що вказує на значне варіювання даного показника. Найбільшим варіюванням ознаки характеризувалася лінія, одержана від схрещування сорту лісостепового екотипу Роставиця (середньопізній сорт) з сортом степового екотипу Дріада 1 (середньостиглий сорт).

Середній показник продуктивної кущистості у 2011 р. становив 2,9 шт. за мінімального значення 2,5 шт. у лінії 26 СС і максимального 3,2 шт. у 12 СС і сорту Білоцерківська напівкарликова (табл. 2).

Таблиця 2 – Продуктивна кущистість стебел у досліджуваних ліній станційного сортовипробування

Лінії і сорти-стандари	Продуктивна кущистість стебел, шт.		Статистичні параметри (середнє за 2011-2012 рр.)		
	2011 р.	2012 р.	Lim, шт.	min	max
			V, %		
Степовий екотип х лісостеповий екотип					
7 СС	2,8	3,2	1	4	27,9
8 СС	3,0	2,7	2	5	30,8
42 СС	3,0	3,1	2	6	32,3
29 СС	3,0	3,3	2	5	29,6
26 СС	2,5	2,7	1	5	43,9
24 СС	2,7	3,1	1	5	30,8
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип					
12 СС	3,2	3,5	2	5	27,9
44 СС	3,1	3,2	1	5	31,3
54 СС	2,8	2,9	2	5	30,8
Степовий екотип х США					
22 СС	3,1	4,0	1	6	37,3
Лісостеповий екотип х США					
17 СС	2,6	3,3	1	5	40,7
Білоцерківська напівкарликова (St)	3,2	3,1	2	5	28,0
Перліна лісостепу (St)	3,0	2,7	1	6	42,2
Подолянка (St)	2,7	3,0	2	4	26,7
НІР ₀₅	0,3	0,2			

Результати досліджень свідчать, що лінії, які мали більшу загальну кущистість у 2011 р., мали в цьому році меншу продуктивну кущистість і вказують на те, що збільшення загальної кущистості не завжди приводить до підвищення продуктивної кущистості.

За більш сприятливих умов для кущіння у 2012 р. середнє значення продуктивних стебел по досліду у 2012 р. становило 3,1 шт. за мінімального показника 2,7 шт. у ліній 8 СС і 26 СС та сорту-стандарту Перлина лісостепу. Найбільшу кількість продуктивних стебел у цьому році мали лінії 22 СС і 12 СС.

Коефіцієнт варіації продуктивної кущистості у досліджуваних ліній і сортів перевищував 20 %, що вказує на значне варіювання цього показника. Лінії 7 СС, 12 СС, 29 СС і сорти Білоцерківська напівкарликова та Подолянка мали найменший коефіцієнт варіації продуктивної кущистості, що свідчить про їх більшу стабільність за цією ознакою порівняно з іншими лініями.

Встановлено, що лінія 24 СС отримана від схрещування лінії лісостепового екотипу Білоцерківська 47 (скверхед) з сортом степового екотипу Одеська 162, в середньому за два роки, мала найбільшу масу зерна з рослини – 4,22 г і достовірно перевищувала всі лінії і сорти-стандари. Слід відмітити, що ця лінія мала один з найменших показників загальної кущистості і середній показник продуктивності. У інших ліній і сортів-стандартів маса зерна з рослини знаходилась в межах від 2,31 г (26 СС) до 3,99 г (44 СС) (табл. 3).

В роки проведення експерименту маса зерна з рослини значно варіювала залежно від генотипу досліджуваних ліній. Умови 2012 р. виявилися більш сприятливими для формування маси зерна з одної рослини, ніж 2011 р. Найменшим коефіцієнтом варіації, що вказує на більшу стабільність, за цією ознакою, характеризувалися наступні лінії – 42 СС (27,8 %) і 29 СС (29,3 %).

Кожен елемент продуктивності є складною полігенною ознакою, зв'язаною часто небажаними кореляціями [10]. Незнання взаємозв'язків між ознаками продуктивності може зменшити або звести на нівіець ефект селекції.

Нашиими дослідженнями встановлено, що між загальною і продуктивною кущистістю існує позитивний кореляційний зв'язок, який коливається від помірного ($r = 0,41 \pm 0,160$) 7 СС до тісного ($r = 0,89 \pm 0,069$) 24 СС, Перлина Лісостепу (St) (табл. 4).

Таблиця 3 – Маса зерна з однієї рослини у досліджуваних ліній станційного сортовипробування

Лінії і сорти-стандарты	Маса зерна з однієї рослини, г			Статистичні параметри (середнє за 2011-2012 рр.)		
	2011 р	2012 р.	\bar{X}	Lim, шт	min	max
Степовий екотип х лісостеповий екотип						
7 СС	2,99	3,54	3,27	1,08	8,14	66,6
8 СС	3,16	3,42	3,29	1,42	6,11	37,8
42 СС	3,65	4,12	3,89	2,57	6,57	27,8
29 СС	2,56	3,31	2,94	1,37	4,08	29,3
26 СС	1,87	2,75	2,31	0,87	3,42	34,1
24 СС	3,78	4,66	4,22	1,08	7,44	40,1
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип						
12 СС	2,44	2,69	2,57	1,27	5,27	38,1
44 СС	3,76	4,21	3,99	1,29	6,54	34,5
54 СС	2,77	4,53	3,65	1,79	9,21	61,9
Степовий екотип х США						
22 СС	2,50	4,32	3,41	1,15	7,92	58,7
Лісостеповий екотип х США						
17 СС	2,08	3,96	3,02	0,76	7,15	51,5
Білоцерківська напівкарликова (St)	2,73	3,93	3,33	1,18	7,75	58,4
Перлина лісостепу (St)	3,13	3,35	3,24	1,37	6,13	42,0
Подолянка (St)	2,74	3,71	3,23	1,50	6,97	50,5
НІР ₀₅	0,27	0,35				

Таблиця 4 – Коефіцієнти кореляції загальної кущистості з продуктивною кущистістю і надземною масою рослини

Лінії і сорти-стандарты	З продуктивною кущистістю $r \pm Sr$		З надземною масою рослини $r \pm Sr$	
	2011 р.	2012 р.	2011 р.	2012 р.
Степовий екотип х лісостеповий екотип				
7 СС	0,42±0,159	0,41±0,160	0,61±0,130	0,35±0,168
8 СС	0,52±0,144	0,55±0,140	0,62±0,129	0,52±0,144
42 СС	0,53±0,143	0,51±0,146	0,59±0,134	0,52±0,144
29 СС	0,56±0,138	0,60±0,132	0,60±0,132	0,53±0,143
26 СС	0,57±0,137	0,53±0,143	0,51±0,146	0,52±0,144
24 СС	0,72±0,110	0,89±0,069	0,40±0,162	0,66±0,122
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип				
12 СС	0,53±0,143	0,32±0,172	0,51±0,146	0,51±0,146
44 СС	0,70±0,114	0,74±0,106	0,60±0,132	0,55±0,140
54 СС	0,62±0,129	0,48±0,150	0,73±0,108	0,33±0,171
Степовий екотип х США				
22 СС	0,79±0,096	0,79±0,096	0,70±0,114	0,70±0,114
Лісостеповий екотип х США				
17 СС	0,53±0,143	0,68±0,118	0,59±0,134	0,35±0,168
Білоцерківська напівкарликова (St)	0,56±0,138	0,79±0,096	0,14±0,193	0,55±0,140
Перлина лісостепу (St)	0,60±0,132	0,89±0,069	0,70±0,114	0,78±0,098
Подолянка (St)	0,62±0,129	0,68±0,118	0,67±0,120	0,35±0,168

Між загальною кущистістю і надземною масою рослини кореляційний зв'язок знаходиться в межах від слабкого ($r = 0,33 \pm 0,171$) до тісного ($r = 0,73 \pm 0,108$) і значно коливається в роки досліджень залежно від комбінації схрещування.

Показник кореляційної залежності загальної кущистості з кількістю зерен з рослини і масою зерна з рослини коливається як по роках досліджень, так і від комбінації батьківських форм, що залучалися до гібридизації. Між загальною кущистістю і кількістю зерен з рослини кореляційний зв'язок змінюється від помірного ($r = 0,31 \pm 0,174$) до тісного ($r = 0,85 \pm 0,081$) (табл. 5).

Таблиця 5 – Коефіцієнти кореляції загальної кущистості з кількістю зерен з рослини та масою зерна з рослини

Лінії і сорти-стандарти	З кількістю зерен з рослини $r \pm Sr$		З масою зерна з рослини $r \pm Sr$	
	2011 р.	2012 р.	2011 р.	2012 р.
Степовий екотип х лісостеповий екотип				
7 CC	0,63 \pm 0,127	0,18 \pm 0,189	0,67 \pm 0,120	0,13 \pm 0,194
8 CC	0,45 \pm 0,155	0,52 \pm 0,144	0,48 \pm 0,150	0,45 \pm 0,155
42 CC	0,51 \pm 0,146	0,41 \pm 0,160	0,44 \pm 0,156	0,35 \pm 0,168
29 CC	0,47 \pm 0,152	0,42 \pm 0,159	0,47 \pm 0,152	0,38 \pm 0,164
26 CC	0,48 \pm 0,150	0,41 \pm 0,160	0,30 \pm 0,174	0,21 \pm 0,185
24 CC	0,43 \pm 0,157	0,64 \pm 0,125	0,28 \pm 0,177	0,49 \pm 0,149
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип				
12 CC	0,43 \pm 0,157	0,41 \pm 0,160	0,33 \pm 0,171	0,44 \pm 0,156
44 CC	0,85 \pm 0,081	0,73 \pm 0,108	0,76 \pm 0,102	0,70 \pm 0,114
54 CC	0,52 \pm 0,144	0,31 \pm 0,174	0,60 \pm 0,132	0,21 \pm 0,185
Степовий екотип х США				
22 CC	0,72 \pm 0,110	0,71 \pm 0,112	0,60 \pm 0,132	0,64 \pm 0,125
Лісостеповий екотип х США				
17 CC	0,75 \pm 0,104	0,34 \pm 0,169	0,65 \pm 0,123	0,28 \pm 0,177
Білоцерківська напівкарликова (St)	0,27 \pm 0,178	0,60 \pm 0,132	0,13 \pm 0,194	0,46 \pm 0,153
Перлина лісостепу (St)	0,62 \pm 0,129	0,78 \pm 0,098	0,53 \pm 0,143	0,53 \pm 0,143
Подолянка (St)	0,59 \pm 0,134	0,34 \pm 0,169	0,56 \pm 0,138	0,60 \pm 0,132

Аналіз кореляційних зв'язків між загальною кущистістю і масою зерна з рослини свідчить, що між ними існує зв'язок від слабкого $r = 0,13 \pm 0,194$ до сильного $r = 0,76 \pm 0,102$. Встановлено, що за схрещування батьківських форм степового екотипу із лісостеповим, між загальною кущистістю і масою зерна з рослини спостерігається найменш тісний кореляційний зв'язок.

Кореляційний аналіз між продуктивною кущистю і надземною масою рослини дає можливість стверджувати, що зв'язок має позитивний характер, а ступінь сполученості в переважної більшості досліджуваних ліній коливається від значного ($r = 0,58 \pm 0,135$) до дуже тісного, близького до функціонального ($r = 0,94 \pm 0,051$). Між продуктивною кущистю і надземною масою рослини кореляційний зв'язок значно вищий ніж між загальною кущистю і надземною масою рослини (табл. 6).

Таблиця 6 – Коефіцієнти кореляції продуктивної кущистості з надземною масою рослини, кількістю зерен і масою зерна з рослини

Лінії і сорти-стандарти	З надземною масою рослини $r \pm Sr$		З кількістю зерен з рослини $r \pm Sr$		З масою зерна з рослини $r \pm Sr$	
	2011 р.	2012 р.	2011 р.	2012 р.	2011 р.	2012 р.
Степовий екотип х лісостеповий екотип						
7 CC	0,71 \pm 0,112	0,85 \pm 0,081	0,82 \pm 0,088	0,75 \pm 0,104	0,73 \pm 0,108	0,72 \pm 0,110
8 CC	0,64 \pm 0,125	0,58 \pm 0,135	0,82 \pm 0,088	0,73 \pm 0,108	0,69 \pm 0,116	0,47 \pm 0,152
42 CC	0,73 \pm 0,108	0,77 \pm 0,100	0,85 \pm 0,081	0,89 \pm 0,069	0,82 \pm 0,088	0,85 \pm 0,081
29 CC	0,69 \pm 0,116	0,74 \pm 0,106	0,79 \pm 0,096	0,83 \pm 0,086	0,72 \pm 0,110	0,75 \pm 0,104
26 CC	0,70 \pm 0,114	0,76 \pm 0,102	0,83 \pm 0,086	0,85 \pm 0,081	0,63 \pm 0,127	0,71 \pm 0,112
24 CC	0,63 \pm 0,127	0,86 \pm 0,078	0,75 \pm 0,104	0,81 \pm 0,091	0,59 \pm 0,134	0,69 \pm 0,116
Лісостеповий екотип х лісостеповий екотип						
12 CC	0,70 \pm 0,114	0,49 \pm 0,149	0,78 \pm 0,098	0,73 \pm 0,108	0,61 \pm 0,130	0,54 \pm 0,141
44 CC	0,73 \pm 0,108	0,71 \pm 0,112	0,83 \pm 0,086	0,79 \pm 0,096	0,66 \pm 0,122	0,57 \pm 0,137
54 CC	0,68 \pm 0,118	0,80 \pm 0,093	0,80 \pm 0,093	0,86 \pm 0,078	0,71 \pm 0,112	0,72 \pm 0,110
Степовий екотип х США						
22 CC	0,94 \pm 0,051	0,75 \pm 0,104	0,97 \pm 0,036	0,80 \pm 0,093	0,88 \pm 0,072	0,73 \pm 0,108
Лісостеповий екотип х США						
17 CC	0,65 \pm 0,123	0,58 \pm 0,135	0,87 \pm 0,075	0,61 \pm 0,130	0,68 \pm 0,118	0,52 \pm 0,144
Білоцерківська напівкарликова (St)	0,68 \pm 0,118	0,72 \pm 0,110	0,74 \pm 0,106	0,80 \pm 0,093	0,53 \pm 0,143	0,64 \pm 0,125
Перлина лісостепу (St)	0,88 \pm 0,072	0,78 \pm 0,098	0,86 \pm 0,078	0,79 \pm 0,096	0,77 \pm 0,100	0,47 \pm 0,152
Подолянка (St)	0,71 \pm 0,112	0,35 \pm 0,168	0,85 \pm 0,081	0,29 \pm 0,176	0,72 \pm 0,110	0,56 \pm 0,138

Результати проведених досліджень свідчать, що між продуктивною кущистю стебел і кількістю зерен з однієї рослини існує сильний кореляційний зв'язок (за виключенням лінії 17 CC і сорту Подолянка у 2012 р.).

Кореляційний зв'язок продуктивної кущистості з масою зерна з однієї рослини в наших дослідженнях характеризується від помірного до тісного.

Висновки. 1. Результати досліджень свідчать, що на формування загальної і продуктивної кущистості в досліджуваних ліній пшениці м'якої озимої значний вплив мають погодні умови і генотип ліній.

2. Збільшення загальної кущистості не завжди приводить до підвищення продуктивної кущистості і маси зерна з рослини. Так лінія 24 СС отримана від схрещування лінії лісостепового екотипу Білоцерківська 47 (скверхед) з сортом степового екотипу Одеська 162, яка мала один з найменших показників загальної кущистості і середній показник продуктивної, в середньому за два роки, мала найбільшу масу зерна з рослини – 4,22 г і достовірно перевищувала всі лінії і сорти-стандарти.

3. Між надземною масою рослини, кількістю зерен і їх масою з рослини та загальною і продуктивною кущистістю існує позитивний кореляційний зв'язок, який залежить від походження ліній і умов дослідження. Найбільш тісний кореляційний зв'язок, який характеризується як сильний, встановлений між продуктивною кущистістю і кількістю зерен з однієї рослини.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Дибиров М. Д. Выявление адаптивного потенциала зерновых видов культурной флоры вдоль высотного градиента / М. Д. Дибиров, Д. М. Анатов // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы эволюции и систематики / Под общей ред. д-ра биол. наук, проф. Н. И. Дзюбенко. – Санкт-Петербург, 8-11 декабря 2009 г. – СПб., 2009. – С. 57-60.
2. Озима пшениця / [В. М. Ремесло, Ф. Г. Кириченко, Ф.М. Куперман та ін.]; під ред. С.М. Бугая. – К.: Урожай, 1969. – 492 с.
3. Лихочвор В. В. Озима пшениця / В. В. Лихочвор, Р. Р. Проць. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2006. – 216 с., іл.
4. Носатовский А. И. Пшеница. Биология / А. И. Носатовский. – Москва: Колос, 1965. – 568 с.
5. Пруцков Ф. М. Озимая пшеница / Ф. М. Пруцков. – М.: Колос, 1970. – 334 с.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
7. Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур (Зернові, круп’яні та зернобобові культури). Вип. 2 / Під ред. В.В. Волкодава, Київ, 2001. – 65 с.
8. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика / П. Ф. Рокицкий. – Мн.: Вышэйшая школа, 1973. – 320 с.

9. Гужов Ю.Л. Тритикале – достижения и перспективы селекции на основе математического моделирования. Монография / Ю. Л. Гужов, П. С. Кесаварао, Р. К. Велланки. – М.: Изд–во. УДН, 1987. – 232 с.

10. Зорунько В.И. Эволюция озимой твердой пшеницы на Юге Украины и России / В. И. Зорунько, В. Н. Пыльнев. // Зб. наук. праць УДАУ (спец. вип.) Біологічні науки і проблеми рослинництва. – Умань, 2003. – С.342-349.

Кустистость пшеницы мягкой озимой разного эколого-географического происхождения и её связь с элементами продуктивности

Л.А. Бурденюк-Тарасевич, Н.В. Лозинский, О.А. Дубова

Показано особенности формирования линиями пшеницы мягкой озимой разного эколого-географического происхождения общей и продуктивной кустистости. Исследовано влияние общей и продуктивной кустистости на формирование массы зерна с одного растения. Установлено корреляционные связи общей и продуктивной кустистости с надземной массой растения, количеством зёрен и массой зерна с растения.

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, общая кустистость, продуктивная кустистость, линии, экотип, количество зёрен, масса зерна, коэффициенты корреляции.